

A PROPOS DES *LECCINUM* DETERMINES

DEPUIS LA SAISON 2002

Par Philippe Givernaud

Faisant suite à mon article publié dans le bulletin numéro 29 de juin 2003, je souhaite faire l'analyse, ici, des différents *Leccinum* que nous avons eu l'occasion de déterminer depuis.

- Section **Scabra** : chair non grisonnant ni noircissant à la coupe.

- Sous-section **Pseudoscabra** : bleu au pied avec ou sans teinte olivâtre

- *Leccinum variicolor* var. *bertauxii* Lannoy & Estades :

Diffère du type par un chapeau plus sombre presque noir, non décoloré par plage.

Chair immuable (non rosissante) sauf le bleu-vert au bas du pied.

Sous bouleaux et trembles.

Leccinum brunneogriseolum fo. *Chlorinum* Lannoy & Estades :

Diffère du type par un chapeau plus pâle, plus vite olivâtre à partir de la marge, un peu comme *Leccinum molle*.

Pied avec un peu plus de vert ou d'olivâtre que le type.

Chair immuable à peu rosissante.

Présence de jaune verdâtre dans les blessures, surtout dans la chapeau.

Sous bouleaux, saules, aulnes et autres feuillus.

- Section **Leccinum** : chair grisonnant à la coupe.

- Sous-section **Fumosa** : Chapeau non orangé, sans grosses mèches. Marge débordante.

- *Leccinum roseotinctum* Watling :

Chapeau blanchâtre, se teintant de saumoné, brun fauve rosâtre, tacheté de rouille avec l'âge.

Marge débordante, légèrement appendiculée.

Pied blanc, roussissant, avec des squamules plus fines en haut devenant plus grossières et plus denses vers la base.

Chair blanche virant au gris rosé puis au violacé noirâtre.

Base du pied vert-bleu.

Sous bouleaux et pins, endroits herbeux.

- *Leccinum fuscoalbum* (Sowerby) Lannoy & Estades :

Chapeau brun à brun chocolat, bai.

Revêtement feutré, paraissant granité sous la loupe.

Marge plus ou moins débordante et appendiculée.

Tubes gris brun.

Pied épaissi de haut en bas ou cylindrique.

Squamules plus fines sous les tubes, brunâtres puis noirâtres en pseudo-réseau à partir de la moitié inférieure du pied.

Chair rosissant puis violacée grisonnant, noirâtre.

Sous feuillus mêlés, terrains humides.

Leccinum variicolor var. *bertauxii* et *Leccinum brunneogriseolum* forme *chlorinum* ont été exposés au Palais sur Vienne le 2 octobre 2005.

Le premier provenait du bois d'Enguernaud (N : 50,98 W : 1,12 grades, 280 m), d'un taillis de chênes mêlés de bouleaux. Malheureusement je ne peux préciser la provenance du deuxième, celui-ci ayant été tiré d'un panier lors de la détermination.

Leccinum roseotinctum quant à lui a été apporté par Michel Ardillier l'année dernière, il a été trouvé en bordure d'étang boisée de chênes et de bouleaux sur la commune de Balledent (N. 51,22 W. 1,23 grades) à une altitude de 300 m. Malgré des prospections régulières celui-ci n'a pas été revu depuis.

Par contre, *L. fuscoalbum* a été retrouvé de nombreuses fois lors de nos expositions cette année, ce qui fait penser qu'il doit être beaucoup plus courant que nous ne le pensions jusqu'à présent. Tout cela demandera à être confirmé lors des prochaines saisons.

Toujours dans la section *Leccinum*, sous-section *Fumosa*, nous avons eu l'occasion de voir à Oléron les 3 et 4 novembre de cette année, *Leccinum nigellum* Redeuilh ined.:

Chapeau à marge arrondie, terminé par une étroite marginelle débordante.

Revêtement constitué de fibrilles apprimées bien visibles à la loupe, d'un brun noir uniforme sans marge décolorée.

Le pied est fusiforme, atténué à la base, recouvert d'écailles très noires sur des côtes qui lui donnent souvent un aspect subréticulé, fuligineux à la base.

La chair est blanche puis vire au rose puis au violacé ardoisé puis au gris noirâtre.

La base du pied est teintée de bleu ou bleu-vert qui peut envahir pratiquement la moitié du pied (bien visible lors d'une coupe).

Habitat mal connu, sous peupliers.

Dans la sous-section *Fumosa*, on remarque que l'effet conjugué du rosissement primaire suivi, quelques minutes après, par le noircissement produit à la coupe une couleur violacée ardoisée de la chair.

. Bibliographie :

-Monographie des *Leccinum* d'Europe : Gilbert Lannoy & Alain Estades.

-Les champignons de France : R. Courtecuisse et B. Duheim

TABLEAU RECAPITULATIF DES ESPECES DECRITES

Ce tableau de *LECCINUM* n'est pas exhaustif.

Sur les **24** espèces, variétés et formes de *Leccinum* de ce tableau, toutes ont été répertoriées en LIMOUSIN sauf 2 :
L.nigellum (du moins à ma connaissance) et, bien sûr, *L.lepidum* (sous chênes verts et chênes-lièges).

Section	Sous-section	Nom	La Chair grisonne	La chair rosit	Chair jaune	Bleu au bas du pied	Couleur du chapeau	Caractères des Squames du pied	Caractères spécifiques	Habitat
Scabra	Scabra	scabrum	0	0	0	0	Fauve ocre	Grises à brunes		Bouleaux
		melaneum	0	0	0	0	Brun noir	Noires	La chair jaunit dans le pied et sous le revêtement du chapeau	Bouleaux
		avellaneum	0	0	0	0	Blanchâtre +/- piqueté de brun	Blanchâtres		Bouleaux
		roseofractum	0	+++	0	0	Brun rouge			Bouleaux
		pulchrum	0	+ à ++	0	0	Brun sombre		Taches jaunes sur chapeau	Bouleaux mêlés, saules
	Olivascentes	molle	0	0	0	Parfois	Brun bistre <u>olivâtre</u> à la marge	Rousses à noirâtres	Chapeau mou, <u>olive</u> à la marge & parfois sur pied au ras des tubes	Bouleaux
		holopus	0	+	0	0	Blanchâtre à <u>olivâtre</u>	Blanchâtres roussâtres	Chair olivâtre dans l'ensemble à la fin	Bouleaux humides, sphaignes
	Pseudoscabra	variicolor	0	+	0	++	Sombre	Brun-noires Pseudo-réseau 2/3 inf.	Chapeau décoloré par zones	Bouleaux humides
		variicolor var. bertauxii	0	0	0	++	Noir	Noires Pseudo-réseau + marqué	Chapeau non décoloré	Bouleaux, trembles.
		brunneogriseolum	0	0 à +	0	++	Brun ocre	Pâles, grises, rousses en dégradé du haut vers le bas	Micacé Chair ochracée dans les blessures du chapeau	Bouleaux, saules
		brunneogriseolum fo. chlorinum	0	0 à +	0	++	+ pâle que le type	Comme le type Simple tomentum gris pâle au début	Comme le type + Olive à la marge et sur le le pied. Chair + jaune-vert dans les blessures chapeau et pied	Bouleaux, saules, aulnes
		umbrinoides	0	+	0	++	Brun gris Micacé sur fond olive	Grossières et espacées + brunes	Pores rosâtres Chair olive rose vert-bleue de haut en bas	Bouleaux

Section	Sous-section	Nom	La Chair grisonne	La chair rosit	Chair jaune	Bleu au bas du pied	Couleur du chapeau	Caractères des Squames du pied	Caractères spécifiques	Habitat
Leccinum	Fumosa	roseofinctum	++	+++	0	++	Blanc saumoné	Blanches puis brunes + denses en bas	Chapeau tacheté de rouille	Bouleaux, pins, endroits herbeux
		diurusculum	++	+	0	++	Gris brun	Pseudo-réseau gris	Ferme, dur	Peupliers
		fuscoalbum	++	++	0	++	Brun	Brunes puis noires. Pseudo-réseau au ½ inf.	Micacé	Feuillus mêlés, terrain humide.
		nigellum	++	++	0	+++	Noir	Pseudo-réseau noir uniforme	Noir	Peupliers mal connu
	Leccinum	callitrichum	++	0	0	++	Crème ochracé, beige	Noires	Mèches sombres	Bouleaux
		versipelle	++	0	0	++	Roux orangé pâle	Pâles vite noires		Bouleaux
		aurantiacum	++	0	0	++	Rouge	Blanches puis rousses		Peupliers, trembles
		quercinum	++	0	0	++	Rouge	Tjs rousses		Chênes voire hêtres, châtaigniers.
		piceinum	+++	0	0	++	Rouge sombre	Tjs rousses jusqu'à noires		Epicéas
	Luteoscabra	Albella	carpini	+++	+	+ ou -	0	Brun olive		Cabossé, Hy. jaune
Luteoscabra		lepidum	++	++	+++	Parfois	Brun fauve	Flocons jaunes	Hy. Jaune ++	Chênes verts Chênes-lièges littoral
		crocipodium	+	+	+++	0	Brun jaune <u>craquelé</u>	Jaunes	Hy. jaune ++	Chênes